


Padrão mediterrâneo no dia a dia

Uma referência flexível para melhorar a qualidade da alimentação e apoiar o controle do diabetes.

Não é um cardápio rígido: valoriza vegetais, frutas, feijões, cereais integrais, azeite e outras fontes de gorduras insaturadas; inclui peixes e reduz carnes processadas e ultraprocessados. Pode ser adaptado aos alimentos brasileiros.



Desenho original inspirado no conceito do Healthy Eating Plate, Harvard. No modelo original, metade corresponde a vegetais e frutas; aqui os vegetais ocupam essa parte e a fruta pode entrar em outra refeição, conforme o plano. Proporções visuais, não percentuais de calorias.

O carboidrato continua contando

- Arroz, pão, massa, batata, mandioca, fruta, leite e feijões fornecem carboidratos em quantidades diferentes. Não são “livres” por serem integrais ou saudáveis.
- Feijão combina proteína, carboidrato e fibra. Ao combinar arroz e feijão, ajuste o total de acordo com a orientação nutricional.
- Se você usa insulina nas refeições, a contagem de carboidratos e a dose seguem seu plano. Não reduza abruptamente a alimentação sem rever o tratamento.

Exemplos para montar a rotina

Exemplo educativo de combinações, sem definir calorias ou doses de insulina.

Refeição	Uma possibilidade
Café da manhã	Iogurte natural sem açúcar + aveia + fruta; ou pão integral com ovo e tomate.
Almoço	Salada e legumes + arroz integral em porção ajustada + feijão + peixe. Considere arroz e feijão no total de carboidratos.
Lanche, se necessário	Fruta com iogurte natural; ou pequena porção de castanhas com uma fonte de proteína conforme o plano.
Jantar	Legumes assados + frango/tofu + quinoa; ou sopa com vegetais, leguminosas e proteína, respeitando o total de carboidratos.

Trocas que facilitam

- Troque bebidas açucaradas por água. Prefira fruta inteira ao suco.
- Use feijão, lentilha e grão-de-bico com frequência; varie verduras e legumes.
- Prefira azeite e castanhas a fontes ricas em gordura saturada, mas cuide das porções. Não é preciso começar a beber vinho.
- Reduza embutidos, biscoitos recheados e refeições ultraprocessadas. Não é necessário proibir todo arroz ou pão branco para começar.

Como acompanhar o resultado

- Observe glicose conforme a orientação recebida, fome, saciedade, peso e bem-estar. Metas e horários de medida são individuais.
- Se houver hipoglicemia, use carboidrato de ação rápida conforme seu plano: o prato saudável não é o tratamento de resgate.
- Doença renal, gestação, uso de insulina e dificuldades alimentares exigem adaptação profissional. Alimentação não substitui medicamentos indicados.

SBD: terapia nutricional no pré-diabetes e DM2, edição 2026

Harvard: Healthy Eating Plate (conceito; arte deste PDF é original)

Harvard: revisão do padrão mediterrâneo